

উদ্ভূত গণিত ২য় পত্র

প্র. ৩৩

অধিকার: ৭ম (বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন
ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ)

স্বজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান (পাঠ্যপরি. ০৩)

৯। $f(x) = \cos x$, $g(x) = \sin x$ দুইটি ত্রিকোণমিতিক
ফাংশন।

ক) $\sin \cos^{-1} \tan \cos^{-1} \frac{y}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ) $f(\pi g(\theta)) = g(\pi(f(\theta)))$ হলে দেখাও, $\theta = \pm \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{4}$

গ) সার্বিক সমীকরণ কর: $f(x) + g(x) = f(2x) + g(2x)$

সমাধান:



৯(ক) নং উত্তর

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত রাশি} &= \sin \cos^{-1} \tan \cos^{-1} \frac{y}{x} \\ &= \sin \cos^{-1} \tan \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y} \end{aligned}$$

$$= \sin \cos^{-1} \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y}$$

$$= \sin \sin^{-1} \frac{\sqrt{2y^2 - x^2}}{y}$$

$$= \frac{\sqrt{2y^2 - x^2}}{y} \quad \underline{\underline{\text{Ans.}}}$$



৯(খ) নং উত্তর

উদ্দীপক হতে পাই, $f(x) = \cos x$, $g(x) = \sin x$

$$\therefore f(\theta) = \cos \theta, \quad g(\theta) = \sin \theta$$

প্রদত্ত সমীকরণ, $f(\pi(g(\theta))) = g(\pi(f(\theta)))$

$$\text{বা, } f(\pi \sin \theta) = g(\pi \cos \theta)$$

$$\text{বা, } \cos(\pi \sin \theta) = \sin(\pi \cos \theta)$$

(অ.প্র.৫)

$$\text{যা, } \sin(\pi \cos \theta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \pi \sin \theta\right) \quad [\because \cos \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right)]$$

$$\text{যা, } \pi \cos \theta = \frac{\pi}{2} \pm \pi \sin \theta$$

$$\text{যা, } \cos \theta = \frac{1}{2} \pm \sin \theta$$

$$\text{যা, } \cos \theta \mp \sin \theta = \frac{1}{2} \quad \text{যা, } (\cos \theta \mp \sin \theta)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{যা, } \cos^2 \theta \mp 2 \cos \theta \sin \theta + \sin^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{যা, } \mp \sin 2\theta + 1 = \frac{1}{4}$$

$$\text{যা, } \mp \sin 2\theta = \frac{1}{4} - 1 \quad \text{যা, } \mp \sin 2\theta = -\frac{3}{4}$$

$$\text{যা, } \pm \sin 2\theta = \frac{3}{4} \quad \text{যা, } \sin 2\theta = \pm \frac{3}{4} \quad \text{যা,}$$

$$\text{যা, } 2\theta = \pm \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\therefore \theta = \pm \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \quad (\text{সিদ্ধান্ত})$$

১৯. (গ) প্র. উত্তর

উল্লিখিত অনুসারে, $f(x) = \cos x$, $g(x) = \sin x$

$$\therefore f(2x) = \cos 2x, g(2x) = \sin 2x$$

সদৃশ পরীক্ষণ, $f(x) + g(x) = f(2x) + g(2x)$

$$\text{যা, } \cos x + \sin x = \cos 2x + \sin 2x$$

$$\text{যা, } (\cos x - \cos 2x) + (\sin x - \sin 2x) = 0$$

$$\text{যা, } 2 \sin \frac{x+2x}{2} \sin \frac{2x-x}{2} + 2 \cos \frac{x+2x}{2} \sin \frac{x-2x}{2} = 0$$

$$\text{যা, } 2 \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2} + 2 \cos \frac{3x}{2} \sin \left(-\frac{x}{2}\right) = 0$$

$$\text{যা, } 2 \sin \frac{x}{2} \left(\sin \frac{3x}{2} - \cos \frac{3x}{2} \right) = 0 \quad [\because \sin(-\theta) = -\sin \theta]$$

(অপর প্র.)

২য়, $\sin \frac{x}{2} = 0$ বা, $\frac{x}{2} = n\pi, n \in \mathbb{Z}$

$\therefore x = 2n\pi; n \in \mathbb{Z}$

অথবা, $\sin \frac{3x}{2} - \cos \frac{3x}{2} = 0$

বা, $\sin \frac{3x}{2} = \cos \frac{3x}{2}$

বা, $\tan \frac{3x}{2} = 1$

বা, $\tan \frac{3x}{2} = \tan \frac{\pi}{4}$

বা, $\frac{3x}{2} = n\pi + \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}$

$\therefore x = \frac{2}{3}(n\pi + \frac{\pi}{4}); n \in \mathbb{Z}$

Ans. $x = 2n\pi, \frac{2}{3}(n\pi + \frac{\pi}{4})$ যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$.

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি:

Type = 01

$$\begin{aligned} ১) \tan^{-1}x \pm \tan^{-1}y &= \tan^{-1} \frac{x \pm y}{1 \mp xy}; \text{ যেখানে } xy < 1 \text{ [+ একমুখ]} \\ &= \pi + \tan^{-1} \frac{x \pm y}{1 \mp xy}; xy > 1 \\ ২) 2\tan^{-1}x &= \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} \\ ৩) \sin^{-1}x \pm \sin^{-1}y &= \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} \pm y\sqrt{1-x^2}\} \\ ৪) \cos^{-1}x \pm \cos^{-1}y &= \cos^{-1} \{xy \mp \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\} \end{aligned}$$

অমার্জিত বিধিমালা:

১) $\sin \theta = 0$ হলে $\theta = n\pi$, $\tan \theta = 0$ হলে $\theta = n\pi$	৫) $\cos \theta = \cos \alpha$ হলে $\theta = 2n\pi \pm \alpha$
২) $\cos \theta = 0$ হলে $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$	৬) $\tan \theta = \tan \alpha$ হলে $\theta = n\pi + \alpha$,
৩) $\sin \theta = 1$ হলে $\theta = (4n+1)\frac{\pi}{2}$	সকল ক্ষেত্রে $n \in \mathbb{Z}$
৪) $\sin \theta = -1$ হলে $\theta = (4n+3)\frac{\pi}{2}$	কোনটি কোন নির্দিষ্ট
৫) $\cos \theta = 1$ হলে $\theta = 2n\pi$	হবে।
৬) $\cos \theta = -1$ হলে $\theta = (2n+1)\pi$	
৭) $\sin \theta = \sin \alpha$ হলে $\theta = n\pi + (-1)^n \alpha$	

২। একটি ত্রিকোণমিতিক ফাংশন হল, $f(x) = \cos x$.

ক) $\sec^2(\tan^{-1} 2) + \csc^2(\cot^{-1} 3)$ এর মান কত?

খ) সমাধা কর: $\sqrt{2}f(3\theta) - f(\theta) = f(5\theta)$

গ) $f(P) = \frac{P}{5}$, $f(Q) = \frac{Q}{n}$ এবং $P+Q = \theta$ হলে, দেখাও যে,

$$\frac{P^2}{5^2} - \frac{2mn\cos\theta}{ns} + \frac{m^2}{n^2} = \sin^2\theta$$

সমাধান:

২(ক) প্র. ৩.

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত রাশি} &= \sec^2(\tan^{-1} 2) + \csc^2(\cot^{-1} 3) \\ &= 1 + \tan^2(\tan^{-1} 2) + 1 + \cot^2(\cot^{-1} 3) \\ &= 1 + \{\tan(\tan^{-1} 2)\}^2 + 1 + \{\cot(\cot^{-1} 3)\}^2 \\ &= 1 + (2)^2 + 1 + (3)^2 \\ &= 1 + 4 + 1 + 9 = 15 \text{ Ans.} \end{aligned}$$

২(খ) নং প্র. ৩.

উদ্দীপক অনুসারে, $f(x) = \cos x$,

$$\therefore f(\theta) = \cos \theta, f(3\theta) = \cos 3\theta, f(5\theta) = \cos 5\theta.$$

প্রদত্ত সমীকরণ,

$$\sqrt{2}f(3\theta) - f(\theta) = f(5\theta) \text{ বা, } \sqrt{2}\cos 3\theta - \cos \theta = \cos 5\theta$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos 3\theta - (\cos \theta + \cos 5\theta) = 0 \text{ বা, } \sqrt{2}\cos 3\theta$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos 3\theta - 2\cos \frac{\theta+5\theta}{2} \cos \frac{\theta-5\theta}{2} = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos 3\theta - 2\cos 3\theta \cos 2\theta = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos 3\theta (1 - \sqrt{2}\cos 2\theta) = 0$$

$$\text{অথবা, } \cos 3\theta = 0 \text{ বা, } 3\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{বা, } \theta = (2n+1)\frac{\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{অথবা, } 1 - \sqrt{2}\cos 2\theta = 0 \text{ বা } \cos 2\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ বা, } \cos 2\theta = \cos \frac{\pi}{4}$$

$$\text{বা, } 2\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4} \text{ বা, } \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}.$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{6}, n\pi \pm \frac{\pi}{8}$ সকল ক্ষেত্রে $n \in \mathbb{Z}$. Ans.

উদ্দীপক ২৩, $f(x) = \cos x$.দেওয়া আছে, $f(P) = \frac{r}{s}$ বা $\cos P = \frac{r}{s}$ বা, $P = \cos^{-1} \frac{r}{s}$ $f(Q) = \frac{m}{n}$ বা, $\cos Q = \frac{m}{n}$ বা, $Q = \cos^{-1} \frac{m}{n}$ বা, $Q = \cos^{-1} \frac{m}{n}$ এক: $P + Q = \theta$

$$\text{বা, } \cos^{-1} \frac{r}{s} + \cos^{-1} \frac{m}{n} = \theta$$

$$\text{বা, } \cos^{-1} \left\{ \frac{r}{s} \cdot \frac{m}{n} - \sqrt{\left(1 - \frac{r^2}{s^2}\right) \left(1 - \frac{m^2}{n^2}\right)} \right\} = \theta$$

$$\text{বা, } \frac{mr}{ns} - \sqrt{1 - \frac{r^2}{s^2} - \frac{m^2}{n^2} + \frac{r^2 m^2}{s^2 n^2}} = \cos \theta$$

$$\text{বা, } \frac{mr}{ns} - \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{r^2}{s^2} - \frac{m^2}{n^2} + \frac{r^2 m^2}{s^2 n^2}}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{mr}{ns} - \cos \theta \right)^2 = \left(\sqrt{1 - \frac{r^2}{s^2} - \frac{m^2}{n^2} + \frac{r^2 m^2}{s^2 n^2}} \right)^2$$

$$\text{বা, } \frac{m^2 r^2}{n^2 s^2} - \frac{2mr \cos \theta}{ns} + \cos^2 \theta$$

$$= 1 - \frac{r^2}{s^2} - \frac{m^2}{n^2} + \frac{m^2 r^2}{n^2 s^2}$$

$$\text{বা, } \frac{r^2}{s^2} - \frac{2mr \cos \theta}{ns} + \frac{m^2}{n^2} = 1 - \cos^2 \theta + \frac{m^2 r^2}{n^2 s^2}$$

$$\therefore \frac{r^2}{s^2} - \frac{2mr \cos \theta}{ns} + \frac{m^2}{n^2} = \sin^2 \theta$$

সমাধি

[বিবেচনা:]

 $a \cos \theta + b \sin \theta = c$ আকারের সমীকরণেরসমাধান করতে, উভয় পক্ষকে $\sqrt{a^2 + b^2}$ দ্বারা গুণ করা হবে,(ii) বামপক্ষকে $\cos A \cos B + \sin A \sin B$

দরকারী বলে এতে দু'পক্ষ মিলে থাকবে।

[সুতরাং বিবেচনা দেখানো হবে।]

৩। দৃষ্টকল্প ০১: $\sec^{-1} \frac{5}{3} + \cot^{-1} \frac{12}{5} + \sin^{-1} \frac{16}{65}$

দৃষ্টকল্প ০২: $\sqrt{3} \sin \theta = 2 + \cos \theta$

ক) দেখানো যে, $2 + \tan^{-1} x = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$ যাচাই করা।

খ) দৃষ্টকল্প ০২ এ বর্ণিত রাশির মান $\frac{\pi}{2}$

গ) $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$ সীমার মধ্যে দৃষ্টকল্প ০২ এর সমাধি নকর।

সমাধি:

৩নং (ক) প্র. উত্তর

ধরি, $\tan^{-1} x = \theta$ বা, $x = \tan \theta$

আমরা জানি, $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$

বা, $\sin 2\theta = \frac{2x}{1+x^2}$

বা, $2\theta = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$

$\therefore 2 \tan^{-1} x = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$ (প্রমাণিত)

৩(খ) নং প্র. উ.

দৃষ্টকল্প ০১ অনুসারে পাই,

উদ্ভূত রাশি = $\sec^{-1} \frac{5}{3} + \cot^{-1} \frac{12}{5} + \sin^{-1} \frac{16}{65}$

= $\tan^{-1} \frac{4}{3} + \tan^{-1} \frac{5}{12} + \tan^{-1} \frac{16}{63}$

= $\tan^{-1} \frac{\frac{4}{3} + \frac{5}{12}}{1 - \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{12}} + \tan^{-1} \frac{16}{63}$

= $\tan^{-1} \left(\frac{16+5}{12} \times \frac{9}{9-5} \right) + \tan^{-1} \frac{16}{63}$

= $\tan^{-1} \left(\frac{21}{12} \times \frac{9}{4} \right) + \tan^{-1} \frac{16}{63}$

= $\tan^{-1} \frac{63}{16} + \tan^{-1} \frac{16}{63}$

= $\tan^{-1} \frac{\frac{63}{16} + \frac{16}{63}}{1 - \frac{63}{16} \cdot \frac{16}{63}} = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{63}{16} + \frac{16}{63}}{0} \right) = \frac{\pi}{2}$ Ans.

[এখানে, $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \frac{\pi}{2}$, $xy = 1$ শর্ত প্রযোজ্য করা গেল]

$\frac{5}{3} \sqrt{25-9} = 4$

$\therefore \sec^{-1} \frac{5}{3} = \tan^{-1} \frac{4}{3}$

$\frac{65}{16} \sqrt{65^2-16^2} = 63$

$\therefore \sin^{-1} \frac{16}{65} = \tan^{-1} \frac{16}{63}$

দ্রষ্টব্য ০২ ২০ ১৯৮০ চ. উত্তর, দ্রষ্টব্য মসীকরণ,

$$\sqrt{3} \sin \theta = 2 + \cos \theta; -2\pi \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} \sin \theta - \cos \theta = 2$$

উভয় পক্ষকে $\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$ দ্বারা ভাগ করে,

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta - \frac{1}{2} \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{3} - \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1$$

$$\text{বা, } \cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3} = -1 \quad [(-1) \text{ দ্বারা গুণ}]$$

$$\text{বা, } \cos \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) = -1$$

$$\text{বা, } \theta + \frac{\pi}{3} = (2n+1)\pi, n \in \mathbb{Z} \quad [\because \cos \theta = -1 \text{ তখন } \theta = (2n+1)\pi]$$

$$\text{বা, } \theta = 2n\pi + \pi - \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{বা, } \theta = 2n\pi + \frac{2\pi}{3}; n \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore \theta = \left(2n + \frac{2}{3} \right) \pi; n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{এখন, } n=0 \text{ তখন } \theta = \frac{2\pi}{3}, (\text{গ্রহণযোগ্য})$$

$$(n=1 \text{ তখন } \theta = \left(2 + \frac{2}{3} \right) \pi = \frac{8\pi}{3} > 2\pi \text{ (গ্রহণযোগ্য নয়)})$$

$$(n=-1 \text{ তখন } \theta = \left(-2 + \frac{2}{3} \right) \pi = -\frac{4\pi}{3} \text{ (গ্রহণযোগ্য)})$$

$$(n=-2 \text{ তখন } \theta = \left(-4 + \frac{2}{3} \right) \pi = -\frac{10\pi}{3} < -2\pi \text{ (গ্রহণযোগ্য নয়)})$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সর্বাধিক সন্মার্বিত, } \theta = \left(2n + \frac{2}{3} \right) \pi, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{এবং } -2\pi \leq \theta \leq 2\pi \text{ সীমার মধ্যে, } \theta = \frac{2\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}$$

[Note: সর্বাধিক অংকে সীমা দেওয়া থাকলে, সর্বাধিক সন্মার্বিত বের করার পর $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ বসিয়ে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সীমার বাইরে পড়বে না।]

Ans.

৪। $f(x) = \cos x$ এবং $g(x) = \sin^{-1} x$

ক) $\sin(2 \tan^{-1} \frac{5}{7})$ এর মান নির্ণয় কর।

খ) দেখাও যে, $g(\sqrt{2} f(\frac{\pi}{2} - \theta)) + g(\sqrt{f(2\theta)}) = \frac{\pi}{2}$

গ) সমাধা কর: $4 f(x) \cdot f(2x) \cdot f(3x) = 1$; $0 < x < \pi$

সমাধান:

৪(ক) নং প্র. উত্তর

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত রাশি} &= \sin(2 \tan^{-1} \frac{5}{7}) = \sin(\sin^{-1} \frac{2 \cdot \frac{5}{7}}{1 + (\frac{5}{7})^2}) \left[\because 2 \tan^{-1} x = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} \right] \\ &= \frac{\frac{10}{7}}{1 + \frac{25}{49}} = \frac{\frac{10}{7}}{\frac{74}{49}} = \frac{10}{7} \times \frac{49}{74} = \frac{35}{37} \end{aligned}$$

Ans. $\frac{35}{37}$

৪(খ) নং প্র. উত্তর

উদ্দীপক হতে পাই, $g(x) = \sin^{-1} x$ এবং $f(x) = \cos x$

$$\therefore f(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta$$

$$\text{এবং } f(2\theta) = \cos 2\theta$$

$$\text{বামপক্ষ} = g(\sqrt{2} f(\frac{\pi}{2} - \theta)) + g(\sqrt{f(2\theta)})$$

$$= g(\sqrt{2} \sin \theta) + g(\sqrt{\cos 2\theta})$$

$$= \sin^{-1}(\sqrt{2} \sin \theta) + \sin^{-1}(\sqrt{\cos 2\theta}) \quad [\because g(x) = \sin^{-1} x]$$

$$= \sin^{-1} \left\{ \sqrt{2} \sin \theta \sqrt{1 - (\sqrt{\cos 2\theta})^2} + \sqrt{\cos 2\theta} \right. \\ \left. \sqrt{1 - (\sqrt{2} \sin \theta)^2} \right\}$$

$$= \sin^{-1} \left\{ \sqrt{2} \sin \theta \cdot \sqrt{1 - \cos 2\theta} + \sqrt{\cos 2\theta} \cdot \sqrt{1 - 2 \sin^2 \theta} \right\}$$

$$= \sin^{-1} \left\{ \sqrt{2} \sin \theta \cdot \sqrt{2 \sin^2 \theta} + \sqrt{\cos 2\theta} \cdot \sqrt{\cos 2\theta} \right\}$$

$$= \sin^{-1} \{ 2 \sin^2 \theta + \cos 2\theta \}$$

$$= \sin^{-1} \{ 1 - \cos 2\theta + \cos 2\theta \}$$

$$= \sin^{-1} 1$$

$$= \sin^{-1} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} = \text{ডানপক্ষ (কম্পনিত)}$$

দেওয়া আছে, $f(x) = \cos x \therefore f(2x) = \cos 2x, f(3x) = \cos 3x$
 প্রদত্ত সমীকরণ, $4f(x) \cdot f(2x) \cdot f(3x) = 1; 0 < x < \pi$

বা, $4\cos x \cos 2x \cos 3x = 1$ বা, $2\cos 2x (2\cos 3x \cos x) = 1$

বা, $2\cos 2x (\cos 4x + \cos 2x) = 1$ $[\because 2\cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)]$

বা, $2\cos 4x \cos 2x + 2\cos^2 2x - 1 = 0$

বা, $2\cos 4x \cos 2x + \cos 4x = 0$ $[\because 1 + \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta]$

বা, $\cos 4x (2\cos 2x + 1) = 0$

২য়, $\cos 4x = 0$ বা, $4x = (2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$

$\therefore x = (2n+1)\frac{\pi}{8}; n \in \mathbb{Z}$

অথবা, $2\cos 2x + 1 = 0$

বা, $\cos 2x = -\frac{1}{2}$ বা, $\cos 2x = \cos \frac{2\pi}{3}$

বা, $2x = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}; n \in \mathbb{Z}$

$\therefore x = n\pi \pm \frac{\pi}{3}; n \in \mathbb{Z}$

$\therefore$ সাধারণ সমাধান, $x = (2n+1)\frac{\pi}{8}, n\pi + \frac{\pi}{3}, n\pi - \frac{\pi}{3}$

এখন,

$n=0$ হলে, $x = \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$

$n=1$ হলে, $x = \frac{3\pi}{8}, \frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$

$n=2$ হলে, $x = \frac{5\pi}{8}, (2\pi + \frac{\pi}{3}), (2\pi - \frac{\pi}{3})$

$n=3$ হলে, $x = \frac{7\pi}{8}, (3\pi + \frac{\pi}{3}), (3\pi - \frac{\pi}{3})$

$n=4$ হলে, $x = \frac{9\pi}{8}, (4\pi + \frac{\pi}{3}), (4\pi - \frac{\pi}{3})$

$n=-1$ হলে, $x = -\frac{\pi}{8}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{-4\pi}{3}$

$\therefore 0 < x < \pi$ সীমার মধ্যে প্রাপ্ত (যাচ) মান হল,

$x = \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{8}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}$ Ans.

৬। একটি বিপরীত ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ, [প্র. ২০]
 $f(x) = \sin^{-1} x$ এবং ~~একটি~~ একটি ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ হল,
 $2 \sin^{-1} x = 3 \cos x$.

ক) দেখাও যে, $2f(x) = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$.

খ) উল্লিখিত সমীকরণটি সমাধান কর যখন $0 < x < 2\pi$.

গ) $f(x) + f(y) + f(z) = \pi$ হলে দেখাও যে,

$$x\sqrt{1-x^2} + y\sqrt{1-y^2} + z\sqrt{1-z^2} = 2xyz.$$

সমাধান:

উ(ক) নং প্র. উত্তর

দেওয়া আছে, $f(x) = \sin^{-1} x = \theta$ (ধরি)

$$\text{বা, } x = \sin \theta.$$

আমরা জানি, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$

$$\text{বা, } \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \sqrt{1-\sin^2 \theta}$$

$$\text{বা, } \sin 2\theta = 2x\sqrt{1-x^2}$$

$$\text{বা, } 2\theta = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$$

$$\text{বা, } 2 \sin^{-1} x = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$$

$$\therefore 2f(x) = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) \quad \underline{\underline{\text{প্রমাণিত}}}$$

উ(খ) নং প্র. উত্তর

প্রদত্ত সমীকরণ, $2 \sin^{-1} x = 3 \cos x$ বা, $2(1-\cos^2 x) - 3 \cos x = 0$

$$\text{বা, } 2 - 2\cos^2 x - 3\cos x = 0 \quad \text{বা, } 2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos^2 x + 4\cos x - \cos x - 2 = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos x(\cos x + 2) - 1(\cos x + 2) = 0$$

$$\text{বা, } (\cos x + 2)(2\cos x - 1) = 0$$

তদ্রূপে, $\cos x + 2 = 0$ বা, $\cos x = -2$ [প্রত্যক্ষভাবে নয় কারণ $-1 \leq \cos x \leq 1$]

$$\text{অথবা, } 2\cos x - 1 = 0 \quad \text{বা, } \cos x = \frac{1}{2} \quad \text{বা, } \cos x = \cos \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{এখন, } n=0 \text{ হলে, } x = \pm \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$$

$$n=1 \text{ হলে, } x = 2\pi \pm \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$$

$$n=2 \text{ হলে, } x = 4\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore 0 < x < 2\pi \text{ সীমার মধ্যে, } \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \quad \underline{\underline{\text{Ans.}}}$$

দেওয়া আছে, $f(x) = \sin^{-1} x = A$ (বিঃ) বা, $x = \sin A$

$\therefore f(y) = \sin^{-1} y = B$ (বিঃ) বা, $y = \sin B$

এক $f(z) = \sin^{-1} z = C$ (বিঃ) বা, $z = \sin C$

যদিও সমীকরণ, $f(x) + f(y) + f(z) = \pi$

বা, $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y + \sin^{-1} z = \pi$

বা, $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \pi - \sin^{-1} z$

বা, $A + B = \pi - C$ ——— ①

বামপক্ষ = $x\sqrt{1-x^2} + y\sqrt{1-y^2} + z\sqrt{1-z^2}$

$= \sin A \sqrt{1-\sin^2 A} + \sin B \sqrt{1-\sin^2 B} + \sin C \sqrt{1-\sin^2 C}$

$= \sin A \cos A + \sin B \cos B + \sin C \cos C$

$= \frac{1}{2} (2 \sin A \cos A + 2 \sin B \cos B) + \sin C \cos C$

$= \frac{1}{2} (\sin 2A + \sin 2B) + \sin C \cos C$

$= \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \frac{2A+2B}{2} \cos \frac{2A-2B}{2} + \sin C \cos C$

$= \sin(A+B) \cdot \cos(A-B) + \sin C \cos C$

$= \sin(\pi - C) \cdot \cos(A-B) + \sin C \cos C$

$= \sin C \cos(A-B) + \sin C \cos C$

$= \sin C \{ \cos(A-B) + \cos C \}$

$= \sin C \{ \cos(A-B) + \cos(\pi - A+B) \}$

$= \sin C \{ \cos(A-B) - \cos(A+B) \}$

$= \sin C \cdot 2 \sin A \sin B$

$= 2 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$

$= 2xyz$

$=$ ডানপক্ষ

সমাপ্ত