

Q 08. দৃশ্যকল্প: ০১: $y = 3x - 6x^2 + 10x^3 - \dots \infty$

দৃশ্যকল্প ০২: $A = (a + 3x)^n$

ক) $(2x - \frac{1}{4x^2})^{12}$ এর বিকৃতিত ৬ তম পদ বের কর,

খ) দৃশ্যকল্প ০১ হতে x কে y এর উর্ধ্বক্রমে প্রকাশ কর,

গ) A এর বিকৃতিত ১ম তিনটি পদ যথাক্রমে $b, \frac{21}{2}bx, \frac{189}{4}bx^2$ হলে a, b, n এর মান বের কর।

সমাধান:

৪(ক)নং উত্তর

প্রদত্ত রাশি = $(2x - \frac{1}{4x^2})^{12}$

রাশিটির বিকৃতিত $(r+1)$ তম পদ = ${}^{12}C_r (2x)^{12-r} \cdot (-\frac{1}{4x^2})^r$

= ${}^{12}C_r \cdot 2^{12-r} \cdot x^{12-r} \cdot (-\frac{1}{4})^r \cdot \frac{1}{x^{2r}}$

= ${}^{12}C_r \cdot 2^{12-r} \cdot (-\frac{1}{4})^r \cdot x^{12-3r}$

$\therefore$ ৬ তম বা $(5+1)$ তম পদ = ${}^{12}C_5 \cdot 2^{12-5} \cdot (-\frac{1}{4})^5 \cdot x^{12-15}$

= ${}^{12}C_5 \cdot 2^7 \cdot (-\frac{1}{4^5}) \cdot x^{-3}$

= $- {}^{12}C_5 \cdot 2^7 \cdot \frac{1}{2^{10}} \cdot x^{-3}$

= $- {}^{12}C_5 \cdot \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{x^3}$

= $-\frac{792}{8x^3}$

= $-\frac{99}{x^3}$ Ans.

দ্রষ্টব্য ০১ ২২৩ নং, $y = 3x - 6x^2 + 10x^3 - \dots \dots \infty$

$$y = 3x - 6x^2 + 10x^3 - \dots \dots \infty$$

বা, $-y = -3x + 6x^2 - 10x^3 + \dots \dots \infty$ [(-) দ্বারা গুন]

বা, $1 - y = 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3 + \dots \dots \infty$

বা, $1 - y = (1 + x)^{-3}$

বা, $1 - y = \frac{1}{(1 + x)^3}$

বা, $(1 + x)^3 = \frac{1}{1 - y}$

বা, $1 + x = \frac{1}{\sqrt[3]{1 - y}}$

বা, $1 + x = (1 - y)^{-\frac{1}{3}}$

বা, $1 + x = 1 + (-\frac{1}{3})(-y) + \frac{(-\frac{1}{3})(-\frac{1}{3}-1)}{2!}(-y)^2 + \frac{(-\frac{1}{3})(-\frac{1}{3}-1)(-\frac{1}{3}-2)}{3!}(-y)^3 + \dots \dots \infty$

বা, $1 + x = 1 + \frac{1}{3}y + \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3}}{2}y^2 + \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{7}{3}}{6}y^3 + \dots \dots \infty$

বা, $x = \frac{1}{3}y + \frac{4}{9 \cdot 2}y^2 + \frac{4 \cdot 7}{27 \cdot 6}y^3 + \dots \dots \infty$

বা, $x = \frac{1}{3}y + \frac{2}{9}y^2 + \frac{14}{81}y^3 + \dots \dots \infty$

$\therefore x = \frac{1}{3}y + \frac{2}{9}y^2 + \frac{14}{81}y^3 + \dots \dots \infty$, ①

ইহা y এর x এর বিস্তারিত উৎপাদন,

৪(গ) নং উত্তর

[প্র. ১২]

$$\begin{aligned} \text{দ্রষ্টব্য ০২ ২৬, } A &= (a+3x)^n \\ &= a^n + n \cdot a^{n-1} (3x) + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} (3x)^2 + \dots \\ &= a^n + n \cdot \frac{a^n}{a} \cdot 3x + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{a^n}{a^2} \cdot 9x^2 + \dots \end{aligned}$$

অতএব, $b = a^n$ — (i)

$$\frac{21}{2} bx = n \cdot \frac{a^n}{a} \cdot 3x$$

বা, $\frac{7}{2} b = n \cdot \frac{a^n}{a}$ [৩x দ্বারা ভাগ]

বা, $\frac{7}{2} = \frac{n}{a}$ [i নং ২৬, $b = a^n$]

বা, $a = \frac{2n}{7}$ — (ii)

এক: $\frac{189 bx^2}{4} = \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{a^n}{a^2} \cdot 9x^2$

বা, $\frac{21}{4} b = \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{a^n}{a^2}$ [9x² দ্বারা ভাগ]

বা, $\frac{21}{4} \cdot a^n = \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{a^n}{a^2}$ [i নং]

বা, $\frac{21}{2} = n(n-1) \cdot \frac{1}{a^2}$ বা, $21a^2 = 2n(n-1)$

বা, $21 \cdot \frac{4n^2}{49} = 2n(n-1)$ [(ii) নং ২৬]

বা, $12n^2 = 14n(n-1)$ বা, $6n = 7(n-1)$ [২n দ্বারা ভাগ]

বা, $7n - 6n = 7$ বা, $n = 7$

(i) নং ২৬, $a = \frac{2 \cdot 7}{7} = 2$

(i) নং ২৬, $b = 2^7 = 128$

Ans. $a = 2, b = 128, n = 7$

প্রা. ০৫. $P(x) = 1 + ax + bx^2$ একটি দ্বিঘাত বহুপদ, একটি বীজগণিতিক রাশি।

ক) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ বীজগণিতিক অভিসৃতি নির্ণয় কর।

খ) $a=9, b=20$ হলে $\frac{x}{P(x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ বের কর এবং তা হতে x^{10} এর সহগ নির্ণয় কর।

গ) $a=1, b=0$ হলে $\{P(x)\}^n$ এর বিস্তৃতিতে তিনটি ক্রমিক পদের সহগের অনুপাত $1:7:42$ হয়, তবে n এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $n \in \mathbb{N}$.

সমাধান: (ক) নং প্রশ্নের উত্তর

প্রদত্ত বীজ, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$

$\therefore$ বীজটির n তম পদ, $U_n = \frac{1}{1+n^2}$

$\therefore$ $(n+1)$ তম পদ, $U_{n+1} = \frac{1}{1+(n+1)^2}$

$= \frac{1}{1+n^2+2n+1}$

$= \frac{1}{2+2n+n^2}$

D'Alembert অনুপাত পরীক্ষা অনুসারে,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2+2n+n^2}}{\frac{1}{1+n^2}}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+n^2}{2+2n+n^2}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(\frac{1}{n^2} + 1)}{n^2(\frac{2}{n^2} + \frac{2}{n} + 1)}$

$= \frac{1}{1} = 1$

$\therefore$ বীজটি অভিসৃতি নয়।

৩(খ) নং উত্তর

উদ্দীপক অনুসারে, $P(x) = 1 + 4x + 5x^2$

$a = 9, b = 20$ হলে $P(x) = 1 + 9x + 20x^2$

$$= 1 + 4x + 5x + 20x^2$$

$$= 1(1 + 4x) + 5x(1 + 4x)$$

$$= (1 + 4x)(1 + 5x)$$

$\therefore$ চূড়ান্ত ফর্ম = $\frac{x}{P(x)} = \frac{x}{(1 + 4x)(1 + 5x)}$

ধরি, $\frac{x}{(1 + 4x)(1 + 5x)} = \frac{A}{1 + 4x} + \frac{B}{1 + 5x}$ — (১)

cover-up নিয়মে, $x = -\frac{1}{4}$ হলে, $A = \frac{-\frac{1}{4}}{1 - \frac{5}{4}} = \frac{-1}{4 - 5}$

$$= 1$$

আবার, $x = -\frac{1}{5}$ হলে, $B = \frac{-\frac{1}{5}}{1 - \frac{4}{5}} = \frac{-1}{5 - 4}$

$$= -1$$

$\therefore$ ১ নং হতে পাই,

$$\frac{x}{(1 + 4x)(1 + 5x)} = \frac{1}{1 + 4x} - \frac{1}{1 + 5x}$$

$$= (1 + 4x)^{-1} - (1 + 5x)^{-1}$$

$$= \{1 - 4x + 4^2x^2 - \dots + (-1)^n 4^n x^n + \dots\}$$

$$- \{1 - 5x + 5^2x^2 - \dots + (-1)^n 5^n x^n + \dots\}$$

$\therefore x^n$ এর সহগ = $(-1)^n 4^n - (-1)^n 5^n = (-1)^n (4^n - 5^n)$

$\therefore x^n$ " " " = $(-1)^n (4^n - 5^n)$

এবং x^{10} " " " = $(-1)^{10} (4^{10} - 5^{10}) = 4^{10} - 5^{10}$ Ans

উ(গ)নঃ উত্তর

উদাহরণ অনুসারে, $p(x) = 1 + ax + bx^2$

$a=1, b=0$ হলে $p(x) = 1+x$

∴ প্রদত্ত রাশি $= \{p(x)\}^n = (1+x)^n$

$(1+x)^n$ এর বিকৃতিত $(r+1)$ তম পদ $= {}^nC_r x^r$

∴ $(r+1)$ তম পদের সহগ $= {}^nC_r$

$(r+2)$ " " " $= {}^nC_{r+1}$

এবং $(r+3)$ " " " $= {}^nC_{r+2}$

অর্থাৎ, ${}^nC_r : {}^nC_{r+1} : {}^nC_{r+2} = 1 : 7 : 42$

অর্থাৎ, ${}^nC_r : {}^nC_{r+1} = 1 : 7$

$$\text{বা, } \frac{n!}{r!(n-r)!} : \frac{n!}{(r+1)!(n-r-1)!} = \frac{1}{7}$$

$$\text{বা, } \frac{(r+1)!(n-r-1)!}{r!(n-r)!} = \frac{1}{7}$$

$$\text{বা, } \frac{(r+1)\cancel{r}!(n-r-1)!}{r!(n-r)(n-r-1)\cancel{!}} = \frac{1}{7} \quad [\because n! = n(n-1)\dots]$$

$$\text{বা, } \frac{r+1}{n-r} = \frac{1}{7}$$

$$\text{বা, } n-r = 7r+7$$

$$\text{বা, } n = 8r+7 \text{ — (1)}$$

$$\text{আবার, } {}^nC_{r+1} : {}^nC_{r+2} = 7 : 42$$

$$\text{বা, } \frac{n!}{(r+1)!(n-r-1)!} : \frac{n!}{(r+2)!(n-r-2)!} = \frac{7}{42}$$

$$\text{বা, } \frac{(r+2)!(n-r-2)!}{(r+1)!(n-r-1)!} = \frac{1}{6}$$

$$\text{বা, } \frac{(r+2)(r+1)!(n-r-2)!}{(r+1)!(n-r-1)(n-r-2)!} = \frac{1}{6}$$

$$\text{বা, } \frac{r+2}{n-r-1} = \frac{1}{6}$$

$$\text{বা, } n-r-1 = 6r+12$$

$$\text{বা, } 8r+7-r-1 = 6r+12 \quad [① \text{ নং অ}]$$

$$\text{বা, } 7r-6r = 12-7+1$$

$$\text{বা, } r = 6$$

① নং এ r এর মান সমিষ্ট,

$$n = 8 \cdot 6 + 7$$

$$= 55$$

Ans. $n = 55$.

□ বিধান দাও

সহকারী অধ্যাপক, গণিত

বেঙ্গাল পাবলিক স্কুল ও কলেজ,

চট্টগ্রাম ইপিজেড।

☎ ০১৪১৯৩২৬১৭৮